

بطاقة لمتلقي العلاج

قد يضر أريفيدج بالجنين أو يؤدي إلى موته.

على متلقيات العلاج ذوات القدرة على الحمل:

- يجب دائمًا استخدام نوعين من وسائل منع الحمل التي يُنصح بها خلال العلاج ولمدة 24 شهرًا بعد تناول الجرعة الأخيرة (الرجاء مراجعة كُتَيْب برنامج منع الحمل التابع لأريفيدج للمزيد من المعلومات)
- إجراء فحص حمل واحد من أجل مراقبة الحمل

على متلقي العلاج الذكور:

- استخدام الواقي الذكري بشكل دائم (مع قاتل المنى، إذا أمكن) عند ممارسة العلاقة الجنسية مع امرأة خلال العلاج ولمدة شهرين بعد تناول الجرعة الأخيرة
- يُمنع التبرّع بالمني خلال العلاج ولمدة شهرين بعد تناول الجرعة الأخيرة

يجب التحدث مع الطبيب على الفور إذا كان لديك أو لشريكك الجنسية تأخير في الدورة الشهرية، كان هنالك شك بحدوث حمل أو حمل.

- المتعالجات - استشيرى الطبيب إذا كنت تعتقدين أنك حامل خلال العلاج بأريفيدج ولمدة 24 شهرًا بعد تناول الجرعة الأخيرة
- المتعالجين- استشير الطبيب إذا كنت تعتقد أن شريكك حامل خلال العلاج بأريفيدج ولمدة شهرين بعد تناول الجرعة الأخيرة

لكافة المتعالجين:

- يُمنع التبرّع بالدم خلال العلاج ولمدة 24 شهرًا بعد تناول الجرعة الأخيرة.
- يُمنع إعطاء هذا الدواء لأي شخص آخر.

يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الاستمارة المحوسبة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الموجودة على موقع وزارة الصحة www.health.gov.il أو من خلال الدخول إلى الرابط: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

أو لشركة "روش" على عنوان البريد الإلكتروني Israel.DrugSafety@roche.com

رقم الهاتف لحالة الطوارئ: