



כרטיס למטופל

אריוודג' עלולה להזיק או לגרום למות העובר

על מטופלות המסוגלות להרות:

- להשתמש תמיד ב-2 סוגים של אמצעי המניעה המומלצים במהלך הטיפול ובמשך 24 חודשים שלאחר נטילת המנה האחרונה (נא לפנות לחוברת התוכנית למניעת הריון של אריוודג' למידע נוסף)
- לבצע בדיקת הריון אחת לחודש כדי לנטר הריון

על מטופלים גברים:

- להשתמש בקונדום באופן קבוע (עם קוטל זרע, במידת האפשר) בזמן קיום יחסי מין עם אישה במהלך הטיפול ובמשך חודשיים שלאחר נטילת המנה האחרונה
- לא לתרום זרע במהלך הטיפול ובמשך חודשיים שלאחר נטילת המנה האחרונה

יש לדבר עם הרופא מיידית אם לך או לכת זוגך ליחסי המין מתעכבת הוסת, יש חשד להריון או הריון.

- מטופלות** - היועצי ברופא במידה ואת חושדת שאת בהריון בזמן הטיפול עם אריוודג' ובמשך 24 חודשים שלאחר נטילת המנה האחרונה
- מטופלים** - היועץ ברופא אם בת זוגך חושדת שהיא בהריון בזמן הטיפול עם אריוודג' ובמשך חודשיים שלאחר נטילת המנה האחרונה

על כלל המטופלים:

- אין לתרום דם במהלך הטיפול ובמשך 24 חודשים שלאחר נטילת המנה האחרונה.
- אין לתת תרופה זו לאף אדם אחר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או ע"י כניסה לקישור: <https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il> או לחברת "רוש" בכתובת אי-מייל Israel.DrugSafety@roche.com

מספר טלפון למקרה חירום: